

小浜特別生産組合 たまねぎ 栽培農薬基準

削減目標	慣行5割減以上		回数	備考		
慣行栽培	化学農薬成分使用回数		16回	特別栽培農産物生産に係る節減対象農薬使用基準回数	基準作型	早出し9～5月
計画	上限化学農薬成分使用回数		8回	上限回数		

●殺虫剤

農薬名	成分	含有量 (%)	成分 回数	ネギアザミウマ	ネギハモグリバエ	タマネギバエ	ハスモンヨトウ	アブラムシ類	コガネムシ		希釈倍率	収穫前日数	使用上限回	備考
アグロスリン乳剤	シペルメトリン	6.0	1	●			●				2000	7日	5回	発生初期、残効性
アディオン乳剤	ペルメトリン	20.0	1	●			●				3000	7日	5回	速効性
ダイアジノン乳剤40	ダイアジノン	40.0	1	●	●	●		●			1000～2000	21日	2回	速効性
ダイアジノン粒剤5	ダイアジノン	5.0	1			●			●		3～5kg	播種時又は定植前	2回	作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土
ランネート45DF	メソミル	45.0	1	●							1000～2000	7日	4回	速効性
モスピラン水溶剤	アセタミプリド	20.0	1	●							2000	7日	3回	速効性

●除草剤及び土壌消毒剤

農薬名	分類	含有量 (%)	成分 回数	一年生雑草							希釈倍率	収穫前日数	使用上限回数	備考
ゴーゴーサン乳剤30	ペンディメタリン	30.0	1	●							70～100L/10a	定植後、60日前	1	全面土壌散布300～500ml/10a
ゴーゴーサン細粒剤F	ペンディメタリン	2.0	1	●							5～6kg/10a	定植前～60日前	1	全面土壌散布定植前(マルチ前)定植後、60日前

小浜特別生産組合 たまねぎ 栽培農薬基準

削減目標	慣行5割減以上		回数	備考		
慣行栽培	化学農薬成分使用回数		16回	特別栽培農産物生産に係る節減対象農薬使用基準回数	基準作型	早出し9～5月
計画	上限化学農薬成分使用回数		8回	上限回数		

●殺菌剤

農薬名	分類	含有量 (%)	成分 回数	ベ ト 病	灰 色 か び 病	白 色 疫 病	灰 色 腐 敗 病	さ び 病	黒 斑 病	軟 腐 病	希 釈 倍 率	収 穫 前 日 数	使用上限回 数	備 考
ダコニール1000	TPN	40.0	1	●	●						1000	7日前	6	予防剤
カーゼートPZ水和剤	シモキサニル	12.0	2	●		●					1000	3日前	3	予防治療効果
	マンゼブ	65.0												
ホライズンドライフフロアブル	シモキサニル	30.0	2	●		●					2500	3日前	3	予防治療効果
	ファモキサドン	22.5												
ジマンダイセン水和剤	マンゼブ	75.0	1	●	●	●	●	●	●		400～600	3日前	5	予防
リドミルMZ水和剤	マンゼブ	55.0	2	●		●					500～750	7日前	3	予防治療効果
	メタラキシル	10.0												
スターナ水和剤	オキシリニック酸	20.0	1							●	1000	7日前	5	治療剤
アグリマイシン100	オキシテトラサイクリン	1.5	0							●	1000	7日前	5	治療剤、抗生物質はカウントしない
	ストレプトマイシン硫酸塩	18.8												
アミスター20フロアブル	アゾキシストロビン	20.0	1	●			●				2000	前日	4	治療剤
オーソサイド水和剤80	キャプタン	80.0	1		●	●					600	前日	5	予防、苗立枯病
Zボルドー	塩基性硫酸銅	58.0	0	●							500	-	-	予防
プロポーズ顆粒水和剤	ベンチアパリカルバイソプロピル	5.0	2	●	●	●					1000	7日前	3	予防治療剤
	TPN	50.0												
ランマンフロアブル	シアゾファミド	9.4	1	●		●					2000	7日前	4	治療剤
セイビアフロアブル20	フルジオキシニル	20.0	1		●		●				1500	前日	3	予防、定植苗は500倍根部浸漬1回処理
ベンレート水和剤	ベノミル	50.0	1		●		●				2000	前日	6	治療剤
スミレックス水和剤	プロシミドン	50.0	1		●		●				1000	前日	5	治療剤
ロブラール水和剤	イプロジオン	50.0	1		●		●		●		1000	7日前	3	治療剤
ベルコート水和剤	イミノクタジンアルベシル酸塩	40.0	1		●		●				1000	前日	5	治療剤
ガスタード微粒剤	ダゾメット	98.0	1							●	20～30kg	定植21日前	1	ネコブセンチュウ、雑草、苗立枯病
ドロクロール	クロルピクリン	80.0	1			●	●				3～6ml / 穴	植付10日以上	1	殺菌(土壌)・殺虫・殺線虫・除草

※表中の農薬を基準に病害虫の発生時期に応じて薬剤を散布する。又、上記以外の薬剤は散布しない。